

Họ tên :

Số báo danh :

Mã đề 104

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Câu 41: Polietilen được trùng hợp từ chất nào sau đây?

- A. etilen. B. etan. C. vinyl clorua. D. buta-1,3-đien.

Câu 42: Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

- A. Sắt và đồng đều bị ăn mòn. B. Sắt bị ăn mòn.
C. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn. D. Đồng bị ăn mòn.

Câu 43: Dây gồm các polime bán tổng hợp là

- A. tơ nylon-6,6 và tơ visco. B. tơ xenlulozơ axetat và tơ nitron
C. tơ polietilen và tơ capron. D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

Câu 44: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất dipeptit ?

- A. 3 chất. B. 5 chất. C. 2 chất. D. 4 chất.

Câu 45: Phát biểu nào sau đây đúng

- A. Tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. B. Etyl amin có công thức CH_3NHCH_3 .
C. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa. D. Ala-Gly có phản ứng màu biure.

Câu 46: Từ các nông sản chứa nhiều tinh bột như gạo, ngô, khoai, sắn,... bằng phương pháp lên men người ta thu được ancol etylic. Công thức hóa học của ancol etylic là

- A. $\text{C}_2\text{H}_3\text{OH}$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. C. $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$. D. $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$.

Câu 47: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ngộ độc khí khi sử dụng lò sưởi trong nhà kín vào mùa đông?

- A. CO_2 . B. NO_2 . C. CO. D. SO_2 .

Câu 48: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al_2O_3 ?

- A. KCl. B. NH_3 . C. NaOH. D. $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.

Câu 49: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

- A. Mg. B. Na. C. K. D. Mg.

Câu 50: Chất nào sau đây **không** tham gia phản ứng thủy phân?

- A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.

Câu 51: Chất nào sau đây có màu da cam ?

- A. CrO_3 . B. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$. C. Cr_2O_3 . D. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_4$.

Câu 52: Ở điều kiện thường chất nào sau đây là thể khí?

- A. Anilin. B. Alanin. C. Glyxin. D. Metylamin.

Câu 53: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

- A. Cu. B. Na. C. Fe. D. Zn.

Câu 54: Nước cứng là nước có chứa nhiều ion

- A. Na^+ , K^+ . B. Na^+ , H^+ . C. K^+ , Ba^{2+} . D. Ca^{2+} , Mg^{2+} .

Câu 55: Tên gọi của chất có công thức $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ là

- A. metyl axetat. B. etyl fomat. C. metyl fomat. D. etyl axetat.

Câu 56: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

- A. NaH_2PO_4 . B. Na_2CO_3 . C. KHSO_3 . D. NaHCO_3 .

Câu 57: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Kim loại đó là

- A. Ca. B. Cu. C. Zn. D. Mg.

Câu 58: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây đúng

- A. Hỗn hợp gồm Na_2O và Al_2O_3 (tỉ lệ mol 1:1) tan được hoàn toàn trong nước dư.
B. Thạch cao sống dùng để nặng tượng, bó bột khi gãy xương.
C. Kim loại Na tác dụng với dung dịch AlCl_3 thu được kim loại Al.
D. Điện phân MgCl_2 nóng chảy, thu được khí Cl_2 ở catot.

Câu 60: Hợp chất Y có công thức phân tử $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$. Cho Y tác dụng với dung dịch KOH sinh ra chất Z có công thức $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{K}$. Công thức cấu tạo của Y là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$. B. HCOOC_2H_5 . C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$. D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.

Câu 61: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic ($\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{COOH}$) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

- A. 11,05. B. 11,15. C. 22,3. D. 14,8.

Câu 62: Nhúng một thanh Al có khối lượng m gam vào dung dịch có chứa 2 muối FeCl_2 , FeCl_3 . Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch X, lấy thanh kim loại sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH có khí thoát ra. X chứa các cation nào sau đây?

- A. Al^{3+} , Fe^{2+} . B. Fe^{3+} , Al^{3+} , Fe^{2+} . C. Al^{3+} . D. Fe^{3+} , Al^{3+} .

Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo. B. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.
C. Dimetylamin có công thức $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$. D. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 64: Trong số các chất: Na_2SO_4 , Al, Al_2O_3 , AlCl_3 , $\text{Al}(\text{OH})_3$, có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 65: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ thì

- A. xuất hiện kết tủa trắng. B. xuất hiện kết tủa trắng và bọt khí.
C. không có hiện tượng gì. D. sủi bọt khí không màu.

Câu 66: Để đề phòng lây lan của SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp, các tổ chức y tế hướng dẫn người dân phải đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay nhiều lần bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn có pha thành phần chất X. Chất X có thể điều chế từ phản ứng lên men chất Y, từ chất Y bằng phản ứng hiđro hóa có thể tạo ra chất Z. Các chất X, Z lần lượt là

- A. Etanol và Sobitol. B. Glucozơ và Sobitol.
C. Etanol và Glucozơ. D. Metanol và Glucozơ.

Câu 67: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất theo thứ tự X, Y, Z thỏa mãn các thí nghiệm:

$\text{X} + \text{Y} \rightarrow$ có kết tủa xuất hiện, có khí thoát ra

$\text{Y} + \text{Z} \rightarrow$ có kết tủa xuất hiện

$\text{X} + \text{Z} \rightarrow$ có khí thoát ra

Cho các chất X, Y, Z lần lượt là:

- (1) H_2SO_4 , BaCO_3 , NaHCO_3 . (2) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, H_2SO_4 .
(3) $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 . (4) HCl, AgNO_3 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$.
(5) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 (loãng). (6) Na_2CO_3 , HCl, H_2SO_4 (loãng).

Số dãy chất thỏa mãn các thí nghiệm trên là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 68: Cho các phát biểu sau:

(1) Nhiệt phân AgNO_3 thu được kim loại.

(2) Khí CO khử được các oxit FeO, Al_2O_3 , ZnO khi đun nóng.

- (3) Dung dịch hỗn hợp HCl và KNO_3 không hòa tan được bột đồng.
 (4) Thành phần supephotphat đơn chỉ chứa $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.
 (5) Cho dung dịch CuSO_4 vào dung dịch NH_3 (dư) thu được kết tủa.
 (6) Photpho trắng phát quang trong bóng tối.

Số phát biểu **sai** là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 69: Valin là một loại amino axit thiết yếu, cần được cung cấp từ nguồn thực phẩm bên ngoài, cơ thể không tự tổng hợp được. Khi cho 1,755 gam valin hòa tan trong nước thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị V là

A. 150 ml. B. 0,15 lít. C. 15 ml. D. 15 lít.

Câu 70: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 54,432 lít O_2 (đktc), thu được H_2O và 75,24 gam CO_2 . Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br_2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,06. B. 0,03. C. 0,08. D. 0,04.

Câu 71: Cho 7,5 gam hỗn hợp kim loại gồm: Na, K, Ba vào nước dư thu được 500 ml dung dịch X có pH = y. Cô cạn dung dịch X thu được 9,71 gam chất rắn khan. Giá trị **gần nhất** của y là

A. 13,2. B. 13,1. C. 13,3. D. 13,4.

Câu 72: Khi thủy phân hoàn toàn một este đơn chức bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Nếu cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được 18,4 gam muối. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO_3 trong dung dịch NH_3 dư thì thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức phân tử của este là

A. $\text{HCOOC}_6\text{H}_4\text{CH}_3$. B. $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_5$. C. $\text{HCOOCH}=\text{CH}_2$. D. HCOOC_6H_5 .

Câu 73: Lên men 1 tấn khoai chứa 85% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất cả quá trình sản xuất là 70%. Khối lượng ancol thu được là

A. 0,668 tấn. B. 0,383 tấn. C. 0,338 tấn. D. 0,833 tấn.

Câu 74: Cho các phát biểu sau

- (a) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước.
 (b) Nhỏ dung dịch Gly-Val vào ống nghiệm chứa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ xuất hiện hợp chất màu tím.
 (c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin, ta tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.
 (d) Oxi hóa glucozơ thu được sobitol.
 (e) Các chất béo bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 75: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm $\text{Cu}(\text{OH})_2$ và NaOH vào lượng vừa đủ dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X với các điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ 1A không đổi. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)	t	1,75t	4t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)	a	2a	5,5a
Lượng kim loại Cu sinh ra ở catot (gam)	6,4	9,6	9,6

Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của m là

A. 30,7. B. 18,7. C. 16,7. D. 15,7.

Câu 76: Một loại khí thiên nhiên X có thành phần phần trăm về thể tích như sau: 85,0% metan, 10,0% etan, 2,0% nitơ, 3,0% khí cacbonic. Biết rằng khi đốt cháy 1 mol metan, 1 mol etan thì lượng nhiệt tỏa ra tương ứng là 880 kJ và 1560 kJ, để nâng 1ml nước lên 1°C cần 4,2J. Giả thiết rằng nhiệt tỏa ra của quá trình đốt cháy X dùng để làm nóng nước với hiệu suất hấp thụ nhiệt khoản 80%. Thể tích X (đktc) cần dùng để đun nóng 10,0 lít nước (khối lượng riêng của nước là 1g/ml) từ 20°C đến 100°C **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. 103,58 lít. B. 123,20 lít. C. 104,08 lít. D. 83,26 lít.

Câu 77: hợp chất hữu cơ chứa C, H, O chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85gam Na_2CO_3 ; 56,1 gam CO_2 ; và 14,85 gam H_2O . Mặt khác, Z phản ứng với H_2SO_4 loãng (dư), thu được 2 axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T chứa C, H, O ($M_T < 126$).

Cho các phát biểu sau:

- (1) X có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn.
- (2) Số nguyên tử H trong T là 10.
- (3) Trong Z chứa $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_2\text{Na}$.
- (4) T phản ứng với dung dịch KOH, Na, dung dịch Br_2 .
- (5) Phân tử khối của X là 196.

Số phát biểu đúng là **A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.**






Câu 78: Chia 37,52 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe_3O_4 , CuO và FeCO_3 thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần 1 trong dung dịch chứa 0,4mol HCl, thu được 0,1mol hỗn hợp 2 khí (có tỉ khối so với H_2 bằng 11,5) dung dịch Y (chỉ chứa muối) và hỗn hợp rắn G (gồm hai kim loại). Hòa tan hết phần 2 với lượng dư dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và 0,265 mol hỗn hợp khí T gồm CO_2 và SO_2 (sản phẩm khử duy nhất của S^{+6}). Phần trăm khối lượng của CuO có trong 37,52 gam hỗn hợp X là

A. 4,26%. B. 6,4%. C. 2,13%. D. 8,53%.

Câu 79: Trên bao bì một loại phân bón NPK của công ty phân bón nông nghiệp Phú Mỹ có ghi độ dinh dưỡng là 15 – 15 – 15. Để cung cấp 107,100 kg nitơ, 10,610 kg photpho và 29,126 kg kali cho 10000 m^2 đất trồng thì người nông dân cần trộn đồng thời phân NPK (ở trên) với đạm urê (độ dinh dưỡng là 46%) và phân kali (độ dinh dưỡng là 60%). Cho rằng mỗi m^2 đất trồng đều được bón với lượng phân như nhau. Vậy, nếu người nông dân sử dụng 90 kg phân bón vừa trộn trên thì diện tích đất trồng được bón phân là

A. 2000 m^2 . B. 4000 m^2 . C. 5000 m^2 . D. 2500 m^2 .

Câu 80: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:



Cho biết: X ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5$) là hợp chất hữu cơ mạch hở; Y ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4$) là este hai chức. X_1 , X_2 , X_3 , Y_1 , Y_2 và Y_3 là các chất hữu cơ khác nhau. Cho các phát biểu sau:

- (1) Phân tử X_3 chứa đồng thời nhóm $-\text{OH}$ và nhóm $-\text{COOH}$.
- (2) Chất X_2 có thể tác động đến thần kinh trung ương của con người. Khi hàm lượng chất X_2 trong máu người tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong.
- (3) Phân tử khối của Y_3 là 146.
- (4) Nhiệt độ sôi của Y_2 thấp hơn nhiệt độ sôi của X_3 .
- (5) 1 mol chất X_1 tác dụng với kim loại Na dư, thu được tối đa 0,5 mol H_2 .

Số phát biểu đúng là **A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.**

----- **HẾT** -----