

**2. CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI  
OLYMPIC 30-4 LẦN VI, NĂM 2000**

(1) Cho dãy  $\{u_n\}$  được xác định như sau:

$$\begin{cases} u_0 = 2000 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^2} ; \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$\text{Tìm } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n}$$

**Giải**

Ta có:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^2}, \quad \forall n \geq 0$$

$$\Rightarrow u_{n+1}^3 = u_n^3 + \frac{1}{u_n^6} + 3 + \frac{3}{u_n^3} \quad (1)$$

$$> u_n^3 + 3, \quad \forall n \geq 0 \quad (\text{Do } u_n > 0, \quad \forall n \geq 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_1^3 > u_0^3 + 3 \\ u_2^3 > u_1^3 + 3, \quad \forall n \geq 1 \\ u_n^3 > u_{n-1}^3 + 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_n^3 > 3n + u_0^3, \quad \forall n \geq 1 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra:

$$u_{n+1}^3 < u_n^3 + 3 + \frac{1}{u_0^3 + 3n} + \frac{1}{(u_0^3 + 3n)^2} < u_n^3 + 3 + \frac{1}{n} + \frac{1}{9n^2}, \quad \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow u_n^3 < u_1^3 + 3(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \frac{1}{9} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2}, \quad \forall n \geq 2 \quad (3)$$

Mặt khác, ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^{\frac{1}{2}} &< 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} \\ &\leq 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) < 2, \quad \forall n \geq 1 \end{aligned} \quad (4)$$

$$\Rightarrow \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 2n, \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} < \sqrt{2n}, \forall n \geq 1 \quad (5)$$

Từ (2), (3), (4) và (5) suy ra:

$$3 + \frac{u_o^3}{n} < \frac{u_n^3}{n} < \frac{u_1^3}{n} + 3 + \sqrt{\frac{2}{n}} + \frac{2}{gn}, \forall n \geq 2$$

Vì  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 3 + \frac{u_o^3}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{u_1^3}{n} + 3 + \sqrt{\frac{3}{n}} + \frac{2}{gn} \right) = 3$

Vậy  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n^3}{n} = 3.$

**2** Cho dãy số  $\{u_n\}$  được định bởi:

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_2 = 2 \\ u_{n+2} = u_n + 2u_{n+1}, n \in N^* \end{cases}$$

Đặt  $a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ . Tính a

### Giải

- Với  $n = 1$ , ta có:

$$u_2^2 - u_1 u_3 = 4 - 1.5 = (-1)^1$$

- Với  $n = k + N$ , giả sử:

$$u_{k+1}^2 - u_k \cdot u_{k+2} = (-1)^k$$

- Với  $n = k + 1$ , ta có

$$\begin{aligned} u_{k+2}^2 - u_{k+1} \cdot u_{k+3} &= u_{k+2} (u_k + 2u_{k+1}) - u_{k+1} (u_{k+1} + 2u_{k+2}) \\ &= u_{k+2} \cdot u_k - u_{k+1}^2 = -(-1)^k = (-1)^{k+1} \end{aligned}$$

Như vậy:  $u_{n+1}^2 - u_n \cdot u_{n+2} = (-1)^n, \forall n \in N$

Để ý rằng:  $u_n \geq 1$ ,  $\forall n \in N$ , nên:

$$\begin{aligned} & \left( \frac{u_{n+1}}{u_n} \right)^2 - \frac{u_{n+2}}{u_n} = \frac{(-1)^n}{u_n^2} \\ & \Rightarrow \left( \frac{u_{n+1}}{u_n} \right)^2 - \frac{u_n + 2u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-1)^n}{u_n^2} \\ & \Rightarrow \left( \frac{u_{n+1}}{u_n} \right)^2 - 2 \frac{u_{n+1}}{u_n} - 1 = \frac{(-1)^n}{u_n^2} \quad (*) \end{aligned}$$

Hơn nữa, cũng từ:  $u_{n+2} = u_n + 2u_{n+1}$ ,  $\forall n \in N$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow u_{n+2} - u_{n+1} = u_n + u_{n+1} > 0, \quad \forall n \in N \\ & \Rightarrow u_{n+2} > u_{n+1}, \quad \forall n \in N \\ & \Rightarrow \{u_n\} \text{ là dãy tăng} \end{aligned}$$

Do đó, nên  $\{u_n\}$  bị chặn thì  $\{u_n\}$  hội tụ về  $b \in R$

Lúc đó, từ:  $u_{n+2} = u_n + 2u_{n+1}$ ,  $\forall n \in N$

$$\begin{aligned} & \Rightarrow b = b + 2b \\ & \Rightarrow b = 0 \\ & \Rightarrow \text{vô lý (vì } u_n \geq 1, \forall n \in N \Rightarrow b \geq 1) \\ & \Rightarrow \{u_n\} \text{ không bị chặn trên} \end{aligned}$$

Như vậy  $\{u_n\}$  tăng và không bị chặn trên, nên:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

Cùng với (\*), suy ra:  $a^2 - 2a - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow a = 1 + \sqrt{2} \quad (\text{vì } a \geq 1)$$

$$\text{Vậy} \quad a = 1 + \sqrt{2}$$

3 Cho  $f: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{Z}$

$n \mapsto f(n)$  thỏa

$$\begin{cases} f(m+n) - f(m) - f(n) \in \{0, 1\}, \forall m, n \in \mathbb{N} \\ f(n) \geq 0, \forall n \in \mathbb{N} \\ f(2) = 0 < f(3), f(9999) = 3333 \end{cases}$$

Tính  $f(2000)$ ?

### Giải

Do  $f(m+n) - f(m) - f(n) \in \{0, 1\}, \forall m, n \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow f(m+n) = f(m) + f(n) \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$$

• Lấy  $m = n = 1$ , ta có:  $0 = f(2) \geq 2f(1)$

$$\Rightarrow f(1) \leq 0$$

Mà  $f(1) \geq 0$  (do giả thiết)

$$\Rightarrow f(1) = 0$$

• Lấy  $m = 2, n = 1$ , ta có:

$$f(3) - \underbrace{f(2)}_0 - \underbrace{f(1)}_1 \in \{0, 1\}$$

Mà  $f(3) > 0$

$$\Rightarrow f(3) = 1$$

$$\Rightarrow f(2 \cdot 3) = f(3+3) \geq f(3) + f(3) = 2$$

$$\Rightarrow f(2 \cdot 3) \geq 2.$$

Giả sử  $f(k \cdot 3) \geq k \quad (k \in \mathbb{N})$

khi đó  $f((k+1) \cdot 3) = f(k_3 + 3) \geq f(k_3) + f(3) \geq k+1$

Như thế ta có:  $f(3 \cdot n) \geq n, \forall n \in \mathbb{N}$

Hơn nữa, nếu  $\begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ f(3n) < n \end{cases}$  thì

$$f(3(n+1)) = f(3n+3) \geq f(3n) + f(3) > n+1$$

Như thế ta có  $f(3m) > m$ ,  $\forall m \geq n$

Nhưng vì  $f(9999) = f(3.3333) = 3333$

$$\Rightarrow f(3.n) = n, \forall n \in \{1, 2, \dots, 3333\}$$

$$\Rightarrow f(3.2000) = 2000$$

$$= f(3.2000)$$

$$\geq f(2.2000) + f(2000)$$

$$\geq 3.f(2000)$$

$$\Rightarrow f(2000) \leq \frac{2000}{3} < 667$$

Mặt khác:

$$f(2000) \geq f(1998) + f(2)$$

$$\geq f(3.666) = 666$$

$$\Rightarrow f(2000) \geq 666$$

Nhưng  $666 \leq f(2000) < 667$

$$\Rightarrow f(2000) = 666 (\text{vì } f(2000) \in \mathbb{Z})$$

4

Cho dãy số  $\{u_n\}$  được xác định bởi:

$$\begin{cases} u_0 > 0, u_1 > 0 \\ u_{n+2} = (u_{n+1} - u_n^2)^{\frac{1}{3}}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Tìm số hạng tổng quát của  $u_n$

Giải

+ Bằng quy nạp, ta có:  $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$

$$+ u_{n+2} = (u_{n+1} - u_n^2)^{\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow \ln u_{n+2} = \frac{1}{3} \ln u_{n+1} + \frac{2}{3} \ln u_n$$

Đặt:  $V_n = \ln u_n, \forall n \geq 0$

$$\Rightarrow V_{n+2} = \frac{1}{3} V_{n+1} + \frac{2}{3} V_n$$

$$x - x_n = (-1)^n \frac{x - x_0}{(1+x)^n (1+x_0)(1+x_1)\dots(1+x_n)}, \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow |x - x_n| \leq \frac{|x - x_0|}{(1+x)^n} = \frac{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}{\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)^n} \rightarrow 0$$

(khi  $n \rightarrow +\infty$ )

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

**25** Cho dãy  $\{y_n\}$  được xác định như sau:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{2} \\ y_n = \frac{1}{2} - \frac{y_{n-1}^2}{2}, n \geq 2 \end{cases}$$

a. Chứng minh rằng:  $-\frac{1}{8} < y_n \leq \frac{1}{2}$ ,  $\forall n \geq 2$

b. Tìm  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

### Giải

•  $n = 1$ :  $y_1 = \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{8} < y_1 \leq \frac{1}{2}$

a. •  $n = 2$ :  $y_2 = \frac{1}{2} - \frac{y_1^2}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{8}$   
 $\Rightarrow -\frac{1}{8} < y_2 \leq \frac{1}{2}$

•  $n = k \geq 2$ : Giả sử  $-\frac{1}{8} < y_k \leq \frac{1}{2}$

•  $n = k + 1$ : Ta có:  $y_{k+1} = \frac{1}{2} - \frac{y_k^2}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{1}{8} < y_{k+1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\left( \text{vì } -\frac{1}{8} < y_k \leq \frac{1}{2} \right)$$

Vậy:  $-\frac{1}{8} < y_n \leq \frac{1}{2}$ ,  $\forall n \geq 1$

- b. Gọi  $y$  là nghiệm phương trình:  $y = \frac{1}{2} - \frac{y^2}{2}$ ,  $-\frac{1}{8} \leq y \leq \frac{1}{2}$   
 Ta có:

$$y - y_1 = \frac{1}{2} - \frac{y^2}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{y^2}{2}$$

$$y - y_2 = -\frac{1}{2}(y^2 - y_1^2) = -\frac{1}{2}(y - y_1)(y + y_1) = \frac{(-1)^2}{2^2} y^2$$

.....

$$y - y_n = \frac{(-1)^n}{2^n} y^2 (y + y_1)(y + 2)\dots(y + y_{n-1}), \quad \forall n \geq 2$$

Cụ thể, ta có  $y = \sqrt{2} - 1$ . Khi đó

$$\begin{aligned} |y + y_n| &\leq |y| + |y_n| \\ &\leq \sqrt{2} - 1 + \frac{1}{2} < 1, \quad \forall n \geq 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow |y - y_n| &\leq \frac{1}{2^n}, \quad \forall n \geq 1 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n &= y = \sqrt{2} - 1. \end{aligned}$$

26

Cho dãy số dương  $\{u_n\}$  thỏa:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q > 0$

Chứng minh rằng:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = q$

### Giải

Do  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q > 0$

Nên  $\forall \epsilon \in (0, q)$ , tồn tại  $N \in \mathbb{N}$  sao cho

$$\forall n \geq N \text{ thì } q - \varepsilon \frac{u_{n+p'}}{u_{np'-1}} < q + \varepsilon, \quad \forall p' \geq 0$$

Cho  $p' = 1, 2, \dots, p$  ( $p \in N$ ), ta có:

$$q - \varepsilon < \frac{u_{n+1}}{u_n} < q + \varepsilon$$

$$q - \varepsilon < \frac{u_{n+2}}{u_{n+1}} < q + \varepsilon$$

.....

$$q - \varepsilon < \frac{u_{n+p}}{u_{n+p-1}} < q + \varepsilon$$

Nhân các bất đẳng thức này vế với vế với nhau, ta có:

$$(q - \varepsilon)^p < \frac{u_{n+p}}{u_n} < (q + \varepsilon)^n$$

$$\Rightarrow u_n^{\frac{1}{n+p}} (q - \varepsilon)^{\frac{p}{n+p}} < \sqrt[n+p]{u_{n+p}} < u_n^{\frac{1}{n+p}} (q + \varepsilon)^{\frac{p}{n+p}}$$

$n \geq N$ , cho  $p \rightarrow +\infty$ , ta được:

$$q - \varepsilon \leq \lim_{p \rightarrow +\infty} \sqrt[n+p]{u_{n+p}} \leq q + \varepsilon$$

$$\Rightarrow q - \varepsilon \leq \lim_{p \rightarrow +\infty} \sqrt[N+p]{u_{N+p}} \leq q + \varepsilon$$

(27)

a. Chứng minh rằng:  $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ ,  $\forall x \geq 0$

b. Đặt  $S_n = \sum_{k=2}^n k \cdot \cos \frac{\pi}{2}$

Tính giới hạn của  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2}$

### Giải

a. Xét

$$f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}, \quad x \geq 0$$

$$f'(x) = -\sin x + x$$

$$f''(x) = -\cos x + 1 \geq 0, \forall x \geq 0$$

$\Rightarrow f$  tăng trên  $[0, +\infty)$

$$\Rightarrow f'(x) \geq f'(0) = 0, \forall x \geq 0$$

$\Rightarrow f$  tăng trên  $[0, +\infty)$

$$\Rightarrow f(x) \geq f(0) = 0, \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow \cos \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \forall x \geq 0$$

b. Theo câu a), ta có:

$$\sum_{k=2}^n k \geq S_n \geq \sum_{k=2}^n k \left(1 - \frac{\pi^2}{2k^2}\right)$$

$$\geq \sum_{k=2}^n k - \frac{\pi^2}{2} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}$$

$$\geq \frac{(n+2)(n-1)}{2} - \frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{n-1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{(n+2)(n-1)}{2} \geq S_n \geq \frac{(n+2)(n-1)}{2} - \frac{\pi^2(n-1)}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right) \geq \frac{S_n}{n^2} \geq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = \frac{1}{2}$

**Nhận xét:** Qua phép chứng minh trên, ta dễ thấy rằng:

- $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$

- $|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}$

(28)

Cho dãy số  $\{u_n\}$  được xác định bởi:

$$\begin{cases} u_0 = 2006 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^2}, \quad n \geq 0 \end{cases}$$

Tìm giới hạn dãy số  $\left\{\frac{u_n^3}{n}\right\}$

### Giải

Ta có  $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n^2}, \quad \forall x \geq 0$

$$\Rightarrow u_{n+1}^3 = u_n^3 + \frac{1}{u_n^6} + 3 + \frac{3}{u_n^3}$$

$$> u_n^3 + 3, \quad \forall x \geq 0 \quad (\text{Do } u_n > 0, \quad \forall x \geq 0)$$

$$\Rightarrow u_n^3 > u_{n-1}^3 + 3, \quad \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow u_n^3 > u_0^3 + 3n, \quad \forall n \geq 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow u_{n+1}^3 < u_n^3 + 3 + \frac{1}{u_n^3 + 3n} + \frac{1}{(u_0^3 + 3n)^2}$$

$$< u_n^3 + 3 + \frac{1}{3n} + \frac{1}{9n^2}, \quad \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow u_n^3 < u_1^3 + 3(n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{3k} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{9k^2}, \quad \forall n \geq 2 \quad (2)$$

Mặt khác, ta có:

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2} < 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1)^2}$$

$$\leq 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) < 2, \quad \forall n \geq 1 \quad (3)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq \sqrt{n} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}} < \sqrt{2n}, \quad \forall n \geq 1 \quad (\text{Do BĐT B.C.S}) \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra:

$$3n + u_0^3 < u_n^3 < u_1^3 + 3n + \sqrt{2n} + 2, \forall n \geq 2$$

$$\Rightarrow 3 + \frac{u_0^3}{n} < \frac{u_n^3}{n} > \frac{u_1^3}{n} + 3 + \sqrt{\frac{2}{n}} + \frac{2}{n}, \forall n \geq 2$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n^3}{n} = 3$$

(29) Cho dãy số  $\{x_n\}$  xác định bởi:

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$$

$$\text{Tìm } \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)$$

### Giải

Trước hết ta chứng minh bất đẳng thức:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, \forall x > 0$$

Xét

$$\begin{cases} f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} & (x > 0) \\ g(x) = x - \ln(1+x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} > 0 & (\forall x > 0) \\ g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow f, g$  đều tăng trên  $(0, +\infty)$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) > f(0) = 0 \\ g(x) > g(0) = 0 \end{cases} \quad (\forall x > 0)$$

Vậy  $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x, \forall x > 0$

$$\text{Tìm } \lim_{n \rightarrow +\infty} (\ln x_n)$$

$$\text{Ta có: } \ln x_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \dots + \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có:

$$\frac{i}{n^2} - \frac{i^2}{2n^4} < \ln\left(1 + \frac{i}{n^2}\right) < \frac{i}{n^2}, \quad \forall i = \overline{1, n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n^2}(1 + 2 + \dots + n) - \frac{1}{2n^4}(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)$$

$$< \ln x_n < \frac{1}{2n^2}(1 + 2 + \dots + n)$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2}}_{v_n} - \underbrace{\frac{1}{2n^4} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{w_n} < \underbrace{\ln x_n}_{u_n} < \underbrace{\frac{1}{n^2} \frac{n(n+1)}{2}}_{w_n}$$

$$\text{Vì } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}$$

(30) Cho hai dãy số  $\{a_n\}$  và  $\{b_n\}$  thỏa

$$\begin{cases} a_1 = \frac{2005}{2006} \\ b_1 = \frac{2007}{2006} \\ a_{n+1} = a_n + \frac{1}{b_n} \\ b_{n+1} = b_n + \frac{1}{a_n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{Tìm } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1001}{a_n + b_n}$$

**Giải**

$$\text{Ta có: } a_2 b_2 = \left(a_1 + \frac{1}{b_1}\right) \left(b_1 + \frac{1}{a_1}\right)$$

$$= a_1 b_1 + \frac{1}{a_1 b_1} + 2 > 4$$

$$\Rightarrow a_2 + b_2 \geq 2\sqrt{a_2 b_2} > 2\sqrt{2.2}$$

Giả sử  $a_k + b_k > 2\sqrt{2k}$  ( $k \in \mathbb{N}$ )

Khi đó:

$$a_{k+1}^2 = a_k^2 + \frac{1}{b_k^2} + \frac{2a_k}{b_k}$$

+

$$b_{k+1}^2 = b_k^2 + \frac{1}{a_k^2} + 2 \frac{b_k}{a_k}$$

$$2a_{k+1}b_{k+1} = 2a_k b_k + \frac{2}{a_k b_k} + 4$$

$$\Rightarrow (a_{k+1} + b_{k+1})^2 = (a_k + b_k)^2 + \left(\frac{1}{a_k} + \frac{1}{b_k}\right)^2 + 2\left(\frac{a_k}{b_k} + \frac{b_k}{a_k}\right) + 4 \\ > 8k + 8 \\ \geq 8(k+1)$$

$$\Rightarrow a_{k+1} + b_{k+1} > 2\sqrt{2(k+1)}$$

$\Rightarrow$  Theo nguyên lý quy nạp, ta có:  $a_n + b_n > 2\sqrt{2n}$ ,  $\forall n \geq 2$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1001}{a_n + b_n} = 0$

(31)

Tìm  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}}$

### Giải

Theo kết quả bài 3, ta có:

$$\ln(1+x) < x, \forall x > 0$$

$$\Rightarrow \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \forall x \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} > \ln(1+n) - \ln n, \forall x \in N$$

$$\Rightarrow a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$> (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n)$$

$$\geq \ln(n+1)$$

$$\Rightarrow a_n > \ln(n+1), \forall x \in N$$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}} = 0$

(32) Cho  $1 < a \leq e^{\frac{1}{e}}$  và dãy số  $\{x_n\}$  xác định bởi:

$$\begin{cases} x_1 = a \\ x_{n+1} = a^{x_n}, n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng: Dãy  $\{x_n\}$  hội tụ

### Giải

- $n = 1 : x_2 = a^{x_1} = a^a > a = x_1$

- $n = k : \text{Giả sử } x_{k+1} > x_k$

- $n = k + 1 : x_{k+2} = a^{x_{k+1}} > a^{x_k} = x_{k+1}$

Vậy  $x_{n+1} > x_n, \forall x \in N$

Xét  $f(x) = \frac{\ln x}{x} - \ln a, x > 1$

$$f(x) = \frac{1 - \ln x}{x} = 0 \Leftrightarrow x = e$$

Bảng biến thiên:

x	1	e	$+\infty$
f'	+	0	-
f	$-\ln a$	$f(e)$	$-\ln a$

Do:  $1 < a \leq e^e$

$$\Rightarrow 0 < \ln a \leq \frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\ln a < 0 \\ f(e) = \frac{1}{e} - \ln a \geq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Tồn tại } x_0 > 1 \text{ sao cho: } f(x_0) = \frac{\ln x_0}{x_0} - \ln a = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\ln x_0}{x_0} = \ln a$$

$$\Leftrightarrow x_0 = a^{x_0}$$

Bây giờ, ta chứng minh  $x_n < x_0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

Quả vậy:

- $n = 1$  :  $x_1 = a < a^{x_0} = x_0$

- $n = k$  : Giả sử  $x_k < x_0$

- $n = k + 1$  : Ta có:  $x_{k+1} = a^{x_k} < a^{x_0} = x_0$

$$\Rightarrow x_n < x_0, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \text{Dãy } \{x_n\} \text{ hội tụ.}$$

(33) Cho dãy số  $\{x_n\}$  thỏa:  $\begin{cases} 0 < x_n < 1 \\ x_{n+1}(1 - x_n) \geq \frac{1}{4}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

Chứng minh rằng:

a.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{2}$

b.  $\frac{1}{2} - \frac{1}{2n} < x_n \leq \frac{1}{2}, \forall n \in \mathbb{N}$

**Giải**

a. Ta có:

$$x_{n+1}(1-x_n) \geq \frac{1}{4} \geq x_n(1-x_n)$$

$$\Rightarrow x_{n+1}(1-x_n) \geq x_n(1-x_n)$$

$$\Rightarrow x_{n+1} \geq x_n \quad (\text{vì } 0 < x_n < 1)$$

$\Rightarrow \{x_n\}$  là dãy tăng và bị chặn nên hội tụ

Đặt  $x = \lim_{n \rightarrow +\infty}$

$$\Rightarrow x(1-x) \geq \frac{1}{4} \quad \left( \text{vì } x_{n+1}(1-x_n) \geq \frac{1}{4}, \forall n \right)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \left( x - \frac{1}{2} \right)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy: } \lim_{n \rightarrow +\infty} = \frac{1}{2}$$

- b. • Ta có:  $x_n \leq x_{n+m}$ ,  $\forall n, m \in \mathbb{N}$

Cố định  $n$ , cho  $n \rightarrow +\infty$ , ta có ngay:

$$x_n \leq \frac{1}{2}$$

• Hơn nữa:

$$+ n = 1 : a_1 > 0 = \frac{1}{2} - \frac{2}{2}$$

$$+ n = k : Giả sử: x_k > \frac{1}{2} - \frac{1}{2k}$$

+  $n = k + 1$  : Theo giả thiết quy nạp, ta có:

$$x_k > \frac{1}{2} - \frac{1}{2k}$$

$$\Rightarrow 1 - x_k < \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} \leq x_{k+1}(1 - x_k) < x_{k+1} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2k} \right)$$

$$\Rightarrow x_{k+1} > \frac{k}{2(k+1)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(k+1)}$$

$\Rightarrow (\text{DPCM})$

(34) Cho  $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  giảm và liên tục

Giải sử hệ  $\begin{cases} f(\alpha) = \beta \\ f(\beta) = \alpha \end{cases}$  có nghiệm duy nhất  $\alpha = \beta = a$   
 $\alpha, \beta \geq 0$

Chứng minh rằng: Dãy  $\{x_{n+1} = f(x_n)\}$  (với  $x_0 > 0$ ) hội tụ về a.

### Giải

Ta chia ra hai trường hợp

\* Nếu  $x_2 > x_0$ :

Khi đó:  $f(x_2) \leq f(x_0)$

$$\Leftrightarrow x_3 \leq x_1$$

$$\Rightarrow f(x_3) \geq f(x_1)$$

$$\Leftrightarrow x_4 \geq x_2$$

.....

Bằng quy nạp, ta có được  $x_{2n} \leq x_{2n+2}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

(Để ý:  $x_{2n} = f(x_{2n-1}) \leq f(0)$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ )

Quả vậy, giả sử  $x_{2k} \leq x_{2k+2}$

Khi đó:  $f(x_{2k}) \geq f(x_{2k+2})$

$$\Leftrightarrow x_{2k+1} \geq x_{2k+3}$$

$$\Leftrightarrow f(x_{2k+1}) \leq f(x_{2k+3})$$

$$\Leftrightarrow x_{2k+2} \leq x_{2k+4}$$

$\Rightarrow (1)$  đúng

Chứng minh tương tự:  $x_{2n-1} > x_{2n+1}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$

(Để ý:  $x_n > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ )

**Như vậy:** •  $\{x_{2n}\}$  tăng k bị chặn trên nên  $\{x_{2n}\}$  hội tụ. Giả sử

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n} = \alpha \geq 0$$

•  $\{x_{2n+1}\}$  giảm và bị chặn dưới nên  $\{x_{2n+1}\}$  hội tụ. Giả sử  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n+1} = \beta \geq 0$

Do f liên tục trên  $[0, +\infty)$ , nên:

$$\begin{aligned} &\left\{ \begin{array}{l} \beta = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{2n+1}) = f(\alpha) \\ \alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{2n+1}) = f(\beta) \end{array} \right. \\ &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta = f(\alpha) \\ \alpha = f(\beta) \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \beta = a$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n+1} = a$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$$

\* Nếu:  $x_2 \leq x_0$ : chứng minh tương tự:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

(Bạn đọc tự làm)

(35)

Cho phương trình:  $x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1 = 0$

Chứng tỏ rằng với mỗi n nguyên dương thì phương trình có duy nhất một nghiệm dương  $x_n$  và tìm  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ .

### Giải

Xét

$$f(x) = x^n + x^{n-1} + \dots + x - 1 \quad (n \in \mathbb{N} \setminus \{1\})$$

$$f'(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \dots + 1 > 0, \quad \forall x > 0$$

Hơn nữa:  $f(0).f(1) = 1 - n < 0$

$\Rightarrow f(x) = 0$  có nghiệm dương duy nhất  $x_n$

$$\text{Khi đó } \begin{cases} 1 = x_n = x_n^2 + \dots + x_n^n \\ 1 = x_{n+1} + x_{n+1}^2 + \dots + x_{n+1}^n + x_{n+1}^{n+1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_n > x_{n+1} > 0$$

(vì ngược lại:  $0 < x_n \leq x_{n+1}$ )

$$\Rightarrow 1 = x_n + x_n^2 + \dots + x_n^n < x_{n+1} + x_{n+1}^2 + \dots + x_{n+1}^n + x_{n+1}^{n+1} < 1$$

$$\Rightarrow 1 < 1 \text{ (vô lý)}$$

$\Rightarrow$  Tồn tại  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ ,  $0 \leq x_0 \leq x_1$

$$\text{Mặt khác, từ } \begin{cases} 1 = x_n \frac{1 - x_n^n}{1 - x_n} & (\forall n \geq 2) \\ 0 < x_n < x_1 < 1 \end{cases}$$

$$\text{Cho } n \rightarrow +\infty, \text{ ta được } 1 = \frac{x_0}{1 - x_0}$$

$$\Leftrightarrow x_0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy } \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{2}$$

**36** Cho dãy số  $\{u_n\}$  được xác định bởi:

$$u_2 = C_{2n}^n \sqrt{n \cdot 4^{-n}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Chứng minh rằng:  $\{u_n\}$  là dãy hội tụ

### Giải

Ta có:

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{C_{2n+2}^{n+1} \cdot \sqrt{n+1} \cdot 4^{-n-1}}{C_{2n}^n \sqrt{n} \cdot 4^{-n}} \\ &= \frac{(2n+2)!}{[(n+1)!]^2} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} \cdot \sqrt{\frac{n+1}{n}} \cdot 4^{-1} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} \cdot \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \frac{n + \frac{1}{2}}{\sqrt{n(n+1)}} > 1$$

$\Rightarrow \{u_n\}$  là dãy dương tăng (1)

Hơn nữa:

$$\begin{aligned} \ln \left( \frac{u_{n+1}}{u_n} \right)^2 &= \ln \frac{n^2 + n + \frac{1}{4}}{n^2 + n} \\ &= \ln \left( 1 + \frac{1}{4(n^2 + n)} \right) \\ &< \frac{1}{4(n^2 + n)} = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

(Do  $\ln(1+x) < x, \forall x > 0$ )

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln \left( \frac{u_{n+1}}{u_n} \right)^2 &< \frac{1}{4} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n-1} \right) \\ \Rightarrow \ln u_{n+1} - \ln u_n &< \frac{1}{8} \left( \frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} \right) \\ \Rightarrow \ln u_{n+1} - \ln u_1 &< \frac{1}{8} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) < \frac{1}{8} \\ \Rightarrow \ln \frac{u_{n+1}}{u_1} &< \frac{1}{8} \\ \Rightarrow u_{n+1} &< u_1 \cdot e^{\frac{1}{8}} \end{aligned} \tag{2}$$

Từ (1) và (2)  $\Rightarrow \{u_n\}$  là dãy hội.

(37) Cho dãy  $\{a_n\}$  xác định như sau:

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\alpha} \left( a_{n-1} + \frac{2005}{a_{n-1}} \right), & n \geq 2 \\ a_1 = 2006 \end{cases}$$

Chứng minh rằng:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sqrt{2005}$

### Giải

Ta có  $a_n > 0, \forall n \geq 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_n &= \frac{1}{2} \left( a_{n-1} + \frac{2005}{a_{n-1}} \right) \\ &\geq \frac{1}{2} 2 \sqrt{a_{n-1} \cdot \frac{2005}{a_{n-1}}} \\ &\geq \sqrt{2005}, \quad \forall n \geq 2 \quad (1) \end{aligned}$$

Mặt khác:

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n-1}} &= \frac{1}{2} + \frac{2005}{2a_{n-1}^2} \\ &\leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \quad \forall n \geq 2 \\ \Rightarrow a_n &\leq a_{n-1}, \quad \forall n \geq 2 \end{aligned}$$

Từ (1), (2)  $\Rightarrow \{a_n\}$  là dãy giảm và bị chặn dưới bởi  $\sqrt{2005}$  nên hội tụ.

$$\begin{aligned} \text{Đặt } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= a \geq \sqrt{2005} \\ \Rightarrow a &= \frac{1}{2} \left( a + \frac{2005}{a} \right) \\ \Leftrightarrow 2a &= a + \frac{2005}{a} \\ \Leftrightarrow a &= \sqrt{2005} \end{aligned}$$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sqrt{2005}$

(37) Cho dãy số  $\{x_n\}$  bị chặn và thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} x_n + x_{n+2} \geq 2x_{n+1}, \quad \forall n \geq 1 \\ x_1 = 2007 \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy số  $\{x_n\}$  có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

### Giải

Gọi A là một chặn dưới của  $\{x_n\}$  khi đó:

$$A_n = \text{Max}\{x_n, x_{n-1}\} \geq A, \quad \forall n \in N$$

Do:

$$\begin{aligned} A_n &= \text{Max}\{x_n, x_{n+1}\} = \text{Max}\left\{x_n, x_{n+1}, \frac{x_n + x_{n+1}}{2}\right\} \\ &\geq \text{Max}\left\{x_{n+1}, \frac{x_n + x_{n+1}}{2}\right\} \geq \text{Max}\{x_{n+1}, x_{n+2}\} = A_{n+1} \end{aligned}$$

$\Rightarrow \{A_n\}$  là dãy giảm và bị chặn dưới nên có giới hạn hữu hạn B.

Ta chứng minh rằng  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = B$

Từ chứng minh trên:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = B$  nên:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in N: n \geq N \Rightarrow B - \frac{\varepsilon}{3} < A_n < B + \frac{\varepsilon}{3}$$

Do đó:  $\forall m > N$  thì  $x_{2m-1} \leq A_{m-1} < B + \frac{\varepsilon}{3}$

- Nếu  $x_m > B - \frac{\varepsilon}{3}$  thì

$$B - \frac{\varepsilon}{3} < x_m \leq A_m < B + \frac{\varepsilon}{3} \quad (1)$$

- Nếu  $x_m \leq B - \frac{\varepsilon}{3}$  thì do định nghĩa của  $A_n$  ta có ngay:

$$\begin{aligned} x_{m+1} &> B - \frac{\varepsilon}{3} \\ \Rightarrow x_m &\geq 2x_{m+1} - x_{m-1} > 2\left(B - \frac{\varepsilon}{3}\right) - \left(B + \frac{\varepsilon}{3}\right) = B - \varepsilon \end{aligned}$$

$$\Rightarrow B - \varepsilon < x_m \leq B - \frac{\varepsilon}{3} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra:

$$B - \varepsilon < x_m < B + \varepsilon, \forall m > N$$

Vậy:  $\lim_{m \rightarrow +\infty} x_m = B$ .

(39) Cho  $\{C_{n,k} / 1 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}^+\} \subset \mathbb{R}$  thỏa mãn:

a.  $C_{n,k} \rightarrow 0$ , khi  $n \rightarrow +\infty$  ( $\forall k \in \mathbb{N}$ )

b.  $\sum_{k=1}^n C_{n,k} \rightarrow 1$ , khi  $n \rightarrow +\infty$

c.  $\sum_{k=1}^n |C_{n,k}| \leq C = \text{const}, \forall n \in \mathbb{R}$

Khi đó: Nếu  $\{a_n\}$  hội tụ thì  $\left\{ b_n = \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k \right\}$  cũng hội

tụ và  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$  (Định lý Taepelitz)

**Giải:**

Giải sử  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$

Khi đó: • Tồn tại hằng số  $D > 0 : |a_n - a| \leq 0, \forall n \in \mathbb{N}$

• Với  $\varepsilon > 0$ , tồn tại  $n_\varepsilon \in \mathbb{N} : |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2C}, \forall n > n_\varepsilon$

$$\leq \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} \varepsilon |C_{n_\varepsilon k}| |a_k - a| + \sum_{k=n_\varepsilon + 1}^n |C_{n,k}| |a_k - a|$$

$$\leq D \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} |C_{n,k}| + \frac{\varepsilon}{2C} \sum_{k=n_\varepsilon + 1}^n |C_{n,k}|$$

$$< D \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} |C_{n,k}| + \frac{\varepsilon}{2C} \cdot C$$

$$\leq D \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} |C_{n,k}| + \frac{\varepsilon}{2}$$

Do  $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_{n,k} = 0, \forall k \in \mathbb{R} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} |C_{n,k}| = 0$

Nên tồn tại  $m_\varepsilon \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} |C_{n,k}| < \frac{\varepsilon}{2D}, \forall n > m_2$  (2)

(với  $\varepsilon$  được xét ở trên)

$$\begin{aligned} \text{Từ (1) và (2)} &\Rightarrow \sum_{k=1}^n C_{n,k} (a_k - a) < D \sum_{k=1}^{n_\varepsilon} |C_{n,k}| + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< D \frac{\varepsilon}{2D} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \forall n > n_\varepsilon + n_\varepsilon \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} (a_k - a) &= 0 \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \sum_{k=1}^n C_{n,k} (a_k - a) + a \sum_{k=1}^n C_{n,k} \right] \\ &= 0 + a \cdot 1 = a \end{aligned}$$

40.

Cho  $\{C_{n,k} / 1 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}\} \subset [0, +\infty)$  thỏa mãn :

a.  $C_{n,k} \rightarrow 0, \text{khi } n \rightarrow +\infty \quad (\forall k \in \mathbb{N})$

b.  $\sum_{k=1}^n C_{n,k} \rightarrow 1, \text{khi } n \rightarrow +\infty$

Khi đó : Nếu  $\{a_n\}$  hội tụ thì  $\left\{ b_n = \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k \right\}$  cũng hội tụ

và  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$

(Hệ quả định lý Toeplitz)

### Giải

Do  $\sum_{k=1}^n C_{n,k} \rightarrow 1 \Rightarrow$  Dãy  $\left\{ \sum_{k=1}^n C_{n,k} \right\}$  bị chặn

$\Rightarrow$  Dãy  $\left\{ \sum_{k=1}^n |C_{n,k}| \right\}$  bị chặn (c)

(Do  $C_{n,k} \geq 0, \forall n, k \in \mathbb{N}$ )

Từ (a), (b), (c)  $\Rightarrow$  (ĐPCM)

(Do định lý Toeplitz)

41. Chứng minh rằng : Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \text{ thì } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

Giải

Sử dụng định lý Toeplitz với  $C_{n,k} = \frac{1}{n}; k = 1, 2, \dots, n$ .

Khi đó :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k = a$

42. Chứng minh rằng : Nếu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \text{ thì } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n a_1 + (n-1)a_2 + \dots + 1 \cdot a_n}{n^2} = \frac{a}{2}$$

Giải

Đặt :  $C_{n,k} = \frac{2(n-k+1)}{n^2}; k = 1, 2, \dots, n$

Khi đó :

- $0 < C_{n,k} \rightarrow 0, \forall k \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \sum_{k=1}^n C_{n,k} &= 2 \sum_{k=1}^n \frac{n-k+1}{n^2} \\ &= 2 \frac{n(n-1+1+n-n+1)}{2n^2} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

(khi  $n \rightarrow +\infty$ )

Theo đó theo định lý Toeplitz:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} \cdot a_k = a$$

Vậy  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n a_1 + (n-1)a_2 + \dots + 1 \cdot a_n}{n^2} = \frac{a}{2}$

43.

Chứng minh rằng : Nếu dãy dương  $\{a_n\}$  hội tụ về a  
dương thì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

**Giải**

**Cách 1 :**

Ta có :  $\ln a_n \rightarrow \ln a$ . Nên theo bài 41, ta có :

$$\frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n} \rightarrow \ln a$$

$$\Rightarrow \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \rightarrow \ln a$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \rightarrow a$$

**Cách 2 :** Ta có :  $\begin{cases} a_n \rightarrow a \\ \frac{1}{a_n} \rightarrow \frac{1}{a} \end{cases}$

Do đó, theo bài 41, ta có :

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \rightarrow a$$

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n} \rightarrow \frac{1}{a}$$

Hơn nữa:

$$\frac{\frac{n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}}{n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

Vì vậy, theo tính chất kẹp:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

(44) Cho dãy số  $\{a_n\}$ . Chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a > 0 \text{ thì } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$$

**Giải**

Đặt  $b_n = \frac{a_n}{a_{n-1}}$ ,  $n \geq 2$  ( $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$ )

Theo bài 43, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n} = a$$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$

(45) Cho  $\{a_n\}$  và  $\{b_n\}$  là dãy số thỏa mãn:

- a.  $b_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$
- b.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_1 + b_2 + \dots + b_n) = +\infty$
- c.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$

Chứng minh rằng:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} = a$

**Giải**

Đặt:  $C_{n,k} = \frac{b_k}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}, 1 \leq k \leq n; k, m \in \mathbb{Z}$

Ta có:

$$C_{n,k} > 0, \forall 1 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_{n,k} = 0, \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{k=1}^n C_{n,k} = 1$$

Do đó theo định lý Toeplitz:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k = a$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} = a$$

(46) Cho  $\{a_n\}$  và  $\{b_n\}$  là hai dãy thỏa mãn:

a.  $b_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$

b.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b_1 + b_2 + \dots + b_n) = +\infty$

c.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$

Chứng minh rằng:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} = c$

### Giải

Đặt  $C_{n,k} = \frac{b_k}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}, 1 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}$

Ta có:

$C_{n,k} > 0, \forall 1 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} = 0, \forall k \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^n C_{n,k} = 1$$

Do đó theo định lý Toeplitz:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} \frac{a_k}{b_k} = c$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} = c$$

(47) Cho 2 dãy số  $\{a_n\}$  và  $\{b_n\}$  thỏa mãn:

a.  $\{b_n\}$  tăng thực sự tới  $+\infty$

b.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = c$

Khi đó:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$  (Định lý Stobz)

### Giải

Đặt: 
$$\begin{cases} x_n = \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}, & n \geq 2 \\ y_n = b_n - b_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

Như vậy:

$$y_n > 0, \forall n \geq 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (y_2 + y_3 + \dots + y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (b - b_1) = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = c$$

Do đó theo định lý bài 45, ta có:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_2 y_2 + x_3 y_3 + \dots + x_n y_n}{y_2 + y_3 + \dots + y_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_1}{b_n - b_1} = c \\ & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{a_n - a_1}{b_n - b_1}}{1 - \frac{b_1}{b_n}} = c \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c \end{aligned}$$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$

48. Tính  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left( 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$

### Giải

Đặt: 
$$\begin{cases} x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} & (n \geq 1) \\ y_n = \sqrt{n} \end{cases}$$

Khi đó:

$\{y_n\}$  tăng thật sự tới  $+\infty$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n} - \sqrt{n-1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = 2$$

Do đó, theo định lý Stobz:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = 2$

**(49)** Chứng minh rằng: Nếu dãy  $\{a_n\}$  thỏa mãn

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1} - a_n) = a \text{ thì } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = a$$

### Giải

Đặt:  $\begin{cases} x_n = a_n & (n \geq 1) \\ y_n = n \end{cases}$

Khi đó:

$\{y_n\}$  là dãy tăng thực sự tới  $+\infty$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - a_{n-1}) = a$$

Do đó, theo định lý Stolz:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = a$

Vậy:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = a$

**(50)** Tính  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{a^{n+1}} \left( a + \frac{a^2}{2} + \dots + \frac{a^n}{n} \right)$ ,  $a > 1$

### Giải

Đặt:  $\begin{cases} x_n = a + \frac{a^2}{2} + \dots + \frac{a^n}{n} & (n \geq 1) \\ y_n = \frac{a^{n+1}}{n} \end{cases}$

Khi đó

$\{y_n\}$  tăng thực sự tới  $+\infty$

$$(\text{vì: } + \frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{na}{n+1} > 1, \forall n \geq \left[ \frac{1}{a-1} \right] + 1)$$

(với  $\left[ \frac{1}{a-1} \right]$  là phần nguyên của  $\frac{1}{a-1}$ )

$$+ y_n > \frac{a^n}{n} = \frac{[1 + (a-1)]^n}{n}$$

$$> \frac{C_n^2(a-1)^2}{n} = \frac{(n-1)(a-1)^2}{2} \rightarrow +\infty \text{ (khi } n \rightarrow +\infty \text{))}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{a_n}{n}}{\frac{a^{n+1}}{n} - \frac{a^n}{n-1}} = \frac{1}{a-1}$$

Do đó, theo stobz:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{a^{n+1}} \left( a + \frac{a^2}{2} + \dots + \frac{a^n}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{a-1}$$

(51)

Cho  $\{C_{n,k} / 1 \leq k \leq n; k, n \in \mathbb{Z}\}$ . Chứng minh rằng:

Nếu  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k = a$ ,  $\forall$  dãy  $\{a_n\}$  thỏa  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$  ( $a \in \mathbb{R}$ )

thì

(i)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_{n,k} = 0, \forall k \in \mathbb{N}$

(ii)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} = 1$

(iii) Tồn tại hằng số  $c > 0$  sao cho:

$$\sum_{k=1}^n |c_{n,k}| \leq c, \forall n \in \mathbb{N}$$

(Điều ngược lại của định lý Toeplitz)

### Giải

$$\text{Lấy } a_n = 1, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k = a = 1$$

$\Rightarrow$  (ii) đúng

$$\text{Lấy } a_n^\ell = \begin{cases} 1, & n = \ell \\ 0, & n \neq \ell \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{(\ell)} = 0, \forall \ell \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n C_{n,k} a_k^{(\ell)} = 0, \forall \ell \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} C_{n,\ell}$$

$\Rightarrow$  (i) đúng

Giả sử (iii) sai, tức là:

$$+ \exists n_1 \in \mathbb{N}: \sum_{k=1}^{n_1} |C_{n_1,k}| > 10^2$$

Ta xây dựng dãy  $\{a_n\}$  có  $n_1$  số hạng đầu tiên như sau:

$$\begin{cases} \text{sign} C_{n_1,k} = \text{sign } a_k \\ |a_k| = \frac{1}{10} \end{cases} \quad (k = \overline{1, n_1})$$

Khi đó:  $\sum_{k=1}^{n_1} C_{n_1,k} a_k = \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{n_1} |C_{n_1,k}| > 10$

Theo (i)  $\exists n_0 \in \mathbb{N}: \sum_{k=1}^{n_1} |C_{n,k}| < 1, \forall n > n_0 \Rightarrow \left| \sum_{k=1}^{n_1} C_{n,k} a_k \right| < \frac{1}{10}$ ,

$$\forall n > n_0$$

+ Cũng do (iii) giả sử sai, nên  $\exists n_0 < n_2 \in \mathbb{N}:$

$$\sum_{k=1}^{n_2} |C_{n_2,k}| > 10^1 + 10 + 1$$

Ta xây dựng  $n_2$  số hạng tiếp theo của dãy  $\{a_n\}$  như sau:

$$\begin{cases} \text{sign} C_{n_2,k} = \text{sign } a_k \\ |a_k| = \frac{1}{10^2} \end{cases} \quad (k = \overline{n_1 + 1, n_2})$$

$$\begin{aligned}
 \text{Khi đó: } \sum_{k=1}^{n_2} C_{n_2,k} a_k &= \sum_{k=1}^{n_1} C_{n_2,k} a_k + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} C_{n_2,k} a_k \\
 &> -\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} \sum_{k=n_1+1}^{n_2} |C_{n_2,k}| \\
 &> -\frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} (10^4 + 10 + 1 - 1) = 10^2
 \end{aligned}$$

+ Giả sử ta xây dựng được  $n_\ell$  ( $n_1 < n_2 < \dots < n_\ell$ ) số hạng tiếp theo của dãy  $\{a_n\}$  thỏa:

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 \text{sign}C_{n_\ell,k} = \text{sign}a_k \quad (k = \overline{n_{\ell-1} + 1, n_\ell}) \\
 |a_k| = \frac{1}{10^\ell} \\
 \sum_{k=1}^{n_\ell} C_{n_\ell,k} a_k > 10^\ell
 \end{array}
 \right.$$

+ Theo (i)  $\exists n_* < n_\ell \in \mathbb{N}: \sum_{k=1}^{n_*} |C_{n,k}| < 1, \forall n > n_*$

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^{n_*} C_{n,k} a_k \right| < \frac{1}{10^\ell}, \forall n > n_*$$

Cũng do (iii) giả sử sai, nên  $\exists n_* < n_{\ell+1} \in \mathbb{N}:$

$$\sum_{k=1}^{n_{\ell+1}} |C_{n_{\ell+1},k}| > 10^{2\ell+2} + 10 + 1$$

Ta xây dựng  $n_{\ell+1}$  số hạng tiếp theo của dãy  $\{a_n\}$  như sau:

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 \text{sign}C_{n_{\ell+1},k} = \text{sign}a_k \\
 |a_k| = \frac{1}{10^{\ell+1}} \quad (k = \overline{n_\ell + 1, n_{\ell+1}})
 \end{array}
 \right.$$

$$\text{Khi đó } \sum_{k=1}^{n_{\ell+1}} C_{n_{\ell+1},k} \cdot a_k = \sum_{k=1}^{n_\ell} C_{n_{\ell+1},k} \cdot a_k + \sum_{k=n_\ell+1}^{n_{\ell+1}} C_{n_{\ell+1},k} \cdot q_k$$

$$\begin{aligned}
&> -\frac{1}{10^\ell} + \frac{1}{10^{\ell+1}} \sum_{k=n+1}^{n_{\ell+1}} |C_{n_{\ell+1}, k}| \\
&> -\frac{1}{10^\ell} + \frac{1}{10^{\ell+1}} (10^{2\ell+2} + 10 + 1 - 1) = 10^{\ell+1}
\end{aligned}$$

Như vậy theo giả thiết quy nạp, ta xây dựng 2 dãy  $\{a_n\}$  và

$$\left\{ \sum_{a=1}^n C_{n,k} a_k \right\} \text{ thỏa:}$$

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n_k} C_{n_k, k} q_k = +\infty \end{cases}$$

(Trong đó:  $\left\{ \sum_{\ell=1}^{n_k} C_{n_k, \ell} q_\ell \right\}$  là một dãy con của  $\left\{ \sum_{a=1}^n C_{n,a} q_a \right\}$ )

Điều này mâu thuẫn với giả thiết. Vì vậy (iii) đúng

**(52)** Cho dãy  $\{a_n\}$  thỏa  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = q$ . Chứng minh rằng:

a. Nếu  $q < 1$  thì  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

b. Nếu  $q > 1$  thì  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = +\infty$

### Giải

a.  $\forall \varepsilon \in (0, 1 - q)$ . Ta có:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = q < q + \varepsilon < 1$

Suy ra, tồn tại  $n_0 \in \mathbb{N}$ :  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < q + \varepsilon, \forall n \geq n_0$

$$\Rightarrow |a_n| < (q + \varepsilon)^{n-n_0} |a_{n_0}|, \forall n > n_0$$

Do:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (q + \varepsilon)^{n-n_0} |a_{n_0}| = 0$

Nên  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

b.  $\forall \varepsilon \in (0, q - 1)$ . Ta có:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = q > q - \varepsilon > 1$

Suy ra, tồn tại  $n_0 \in \mathbb{N}$ :  $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > q - \varepsilon, \forall n \geq n_0$

$$\Rightarrow |a_n| > (q - \varepsilon)^{n-n_0} |a_{n_0}|, \forall n > n_0$$

Do:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (q - \varepsilon)^{n-n_0} |a_{n_0}| = +\infty$

Nên  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = +\infty$

(53) Cho dãy  $\{a_n\}$  thỏa  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q$ . Chứng minh rằng:

a. Nếu  $q < 1$  thì  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

b. Nên  $q > 1$  thì  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = +\infty$

### Giải

a.  $\forall \varepsilon \in (0, 1 - q)$ , ta có  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q < q + \varepsilon < 1$

Suy ra, tồn tại  $n_0 \in \mathbb{N}$ :  $\sqrt[n]{|a_n|} < q + \varepsilon, \forall n \geq n_0$

$$\Rightarrow |a_n| < (q + \varepsilon)^n, \forall n \geq n_0$$

Mà:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (q + \varepsilon)^n = 0$  nên  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

b.  $\forall \varepsilon \in (0, q - 1)$ . Ta có:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = q > q - \varepsilon > 1$

Suy ra, tồn tại  $n_0 \in \mathbb{N}$ :  $\sqrt[n]{|a_n|} > q - \varepsilon, \forall n \geq n_0$

$$\Rightarrow |a_n| > (q - \varepsilon)^n, \forall n \geq n_0$$

Do  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (q - \varepsilon)^n = +\infty$  nên  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = +\infty$

**(54.)** Chứng minh rằng không tồn tại  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n$

**Giải**

Giả sử giới hạn dãy số  $\{a_n\}$  tồn tại. Khi đó:

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} [\sin(n+2) - \sin n] = 2 \sin 1 \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(n+1)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n = 0 \quad (1)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} [\cos(n+2) - \cos n] = -2 \sin 1 \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(n+1)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n = 0 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin^2 n + \cos^2 n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin^2 n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^2 n = 0 \text{ (vô lý)}$$

Vậy, giới hạn của  $\{\sin n\}$  không tồn tại.

**(55.)** Tính  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{e} - 1)$

**Giải**

$$\text{Ta có: } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$$

(Bạn đọc kiểm tra bất đẳng thức kép này)

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{n} < \sqrt[n]{e} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}}$$

$$\Leftrightarrow 1 < n(\sqrt[n]{e} - 1) < n \left[ \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} - 1 \right]$$

$$\text{Hơn nữa: } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \leq 1 + \frac{1}{n^2} \text{ (Do BĐT Bernoulli)}$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3}$$

$$\Rightarrow n \left[ \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{1+\frac{1}{n}} - 1 \right] \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow 1 < n(\sqrt[n]{e} - 1) \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$$

Do đó:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(\sqrt[n]{e} - 1) = 1$