


Thời gian: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐỀ: 528

Họ và tên học sinh:.....

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào sau đây?



- A. $y = -x^4 + 2x^2$. B. $y = x^4 - 2x^2$. C. $y = -x^2 + 2x$. D. $y = x^3 + 2x^2 - x - 1$.

Câu 2. Thê tích hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B với $BA = 2a$; $BC = 3a$. SA vuông góc (ABC) và $SA = a$. Thê tích V của khối chóp $S.ABC$ là

- A. $V = 4a^3$. B. $V = 3a^3$. C. $V = 2a^3$. D. $V = a^3$.

Câu 3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-2) < 3$

- A. $(-\infty; 10)$ B. $(2; 11)$ C. $(-\infty; 11)$ D. $(2; 10)$

Câu 4. Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 5(\text{cm})$ và khoảng cách giữa hai đáy bằng $7(\text{cm})$. Diện tích xung quanh của hình trụ là

- A. $35\pi(\text{cm}^2)$ B. $70\pi(\text{cm}^2)$ C. $120\pi(\text{cm}^2)$ D. $60\pi(\text{cm}^2)$

Câu 5. Phương trình $9^x - 12 \cdot 3^x + 27 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tính $S = x_1^2 + x_2^2$

- A. $S = 12$ B. $S = 3$ C. $S = 90$ D. $S = 5$

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có diện tích đáy bằng 10 và $AA' = 6$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$

- A. 20 B. 90 C. 60 D. 16

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$. Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = 2a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$.

- A. $2a^3$ B. a^3 C. $6a^3$ D. $\frac{a^3}{2}$

Câu 8. Tập xác định của hàm số $y = \ln(-2x+6)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

B. $\mathbb{R}$

C. $(3; +\infty)$

D. $(-\infty; 3)$

Câu 9. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ có đồ thị (C) . Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.


A. 3

B. 1

C. 0

D. 2

Câu 10. Cho $a, b > 0; a \neq 1; b \neq 1$ Đồ thị các hàm số $y = a^x$, $y = b^x$ được cho trong hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng



A. $0 < a < 1; b > 1$

B. $a > 1; b > 1$

C. $0 < a < 1; 0 < b < 1$

D. $a > 1; 0 < b < 1$

Câu 11. Thể tích V của khối cầu có bán kính $R = 4$ bằng


A. $V = 64\pi$.

B. $V = 36\pi$.

C. $V = 48\pi$.

D. $V = \frac{256\pi}{3}$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi M, m là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên $[-2; 3]$. Tính $S = M - m$



A. $S = 7$

B. $S = 5$

C. $S = 6$

D. $S = 1$

Câu 13. Giải phương trình $3^{2-x} = 27$.

A. $x = -2$.

B. $x = -1$.

C. $x = 1$.

D. $x = 0$.

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					
	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 4 = 0$ là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 15. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng 4. Diện tích xung quanh của hình nón bằng

- A. $4\pi\sqrt{2}$ B. $10\pi\sqrt{2}$ C. $8\pi\sqrt{2}$ D. $16\pi\sqrt{2}$

Câu 16. Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_2(3x-1) - 3 = 0$.

- A. $S = \{3\}$ B. $S = \{2\}$ C. $S = \{1\}$ D. $S = \{5\}$

Câu 17. Cho hàm số $y = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 - 3$, hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây

- A. $(1; +\infty)$ B. $(0; 1)$ C. $(-\infty; 0)$ D. $(-1; 1)$

Câu 18. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Khoảng nghịch biến của hàm số là

- A. $(-1; 1)$. B. $(-1; 3)$. C. $(-1; +\infty)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 19. Cho khối nón có bán kính $r = \sqrt{5}$ và chiều cao $h = 3$. Tính thể tích V của khối nón.

- A. $V = 9\pi\sqrt{5}$. B. $V = 5\pi$. C. $V = \pi\sqrt{5}$. D. $V = 3\pi\sqrt{5}$.

Câu 20. Giải bất phương trình $5^{2x-1} \geq 125$.

- A. $x \geq \frac{3}{2}$. B. $x \geq 2$. C. $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$. D. $x \leq 2$.

Câu 21. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{2}{3}}(3x-3) > \log_{\frac{2}{3}}(x+5)$.

- A. $S = (-5; 4)$. B. $S = (4; +\infty)$. C. $S = (1; 4)$. D. $S = (-\infty; 4)$.

Câu 22. Tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ lần lượt là:

- A. $y = -1$ và $x = 2$ B. $y = 2$ và $x = 1$.

C. $y = 1$ và $x = -1$.

D. $y = 1$ và $x = 2$.

Câu 23. Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = 3a, AB = 4a, AD = 5a$. Thể tích của khối hộp đã cho là

A. $40a^3$.

B. $60a^3$.

C. $20a^3$.

D. $12a^3$.

Câu 24. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
y'				
y	5	2	4	$-\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 25. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	-2	-3	-2	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

A. -2.

B. -1.

C. 0.

D. -3.

Câu 26. Một hình cầu có bán kính bằng 2 (m). Hỏi diện tích của mặt cầu bằng bao nhiêu?

A. π (m²).

B. 8π (m²).

C. 4π (m²).

D. 16π (m²).

Câu 27. Tập xác định của hàm số $y = (x-2)^{-3}$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

B. $(2; +\infty)$

C. $(-\infty; 2)$

D. $\mathbb{R}$

Câu 28. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 \left(\frac{2}{a^3} \right)$ bằng

A. $1 - 3\log_2 a$.

B. $2\log_2 a$.

C. $1 + 3\log_2 a$.

D. $2 - 3\log_2 a$.

Câu 29. Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng 4, diện tích xung quanh bằng 48π . Thể tích của hình trụ đó bằng

A. 32π .

B. 72π .

C. 24π .

D. 96π .

Câu 30. Đạo hàm của hàm số $y = e^{x^2-3}$ là

A. $y' = 2x.e^{x^2-3}$

B. $y' = e^{x^2-3}$

C. $y' = (x^2 - 3).e^{x^2-4}$

D. $y' = 2x.e^{x^2-4}$

Câu 31. Rút gọn biểu thức $Q = \frac{\sqrt[4]{b} \cdot (b^2)^3}{\sqrt{b^3}}$ với $b > 0$ và viết dưới dạng số mũ hữu tỉ ta được đáp án là

- A. $Q = b$ B. $Q = b^{\frac{13}{4}}$ C. $Q = b^{\frac{17}{2}}$ D. $Q = b^{\frac{19}{4}}$

Câu 32. Biết rằng đường thẳng $y = x + 3$ cắt đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 7$ tại điểm duy nhất có tọa độ $(x_0; y_0)$. Tìm y_0

- A. $y_0 = 1$ B. $y_0 = -1$ C. $y_0 = 5$ D. $y_0 = 2$

Câu 33. Gọi M, m là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 2x + 3$ trên $[-1; 1]$. Tính giá trị $S = M + m$

- A. 1 B. $\frac{53}{8}$ C. $\frac{31}{24}$ D. $\frac{4}{3}$

Câu 34. Số cực trị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có $f'(x) = x(x+1)(x-2)^5(x-3)^4$

- A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 35. Cho $a, b > 0$ thỏa $a^2b = 8$. Tính giá trị biểu thức $T = 2\log_4 a + \log_4 b$

- A. 3 B. $\frac{5}{2}$ C. 8 D. $\frac{3}{2}$


Câu 36. Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(m^2 + 1)x^2 + (5m - 6)x + m$ đạt cực đại tại $x = 1$

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 37. Cho hình trụ có chiều cao là $2a$. Khi cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục của hình trụ một khoảng bằng $a\sqrt{3}$, ta được thiết diện là hình chữ nhật có diện tích bằng $4a^2$. Tính thể tích V của khối trụ.

- A. $V = 7\sqrt{7}\pi a^3$. B. $V = \frac{7\sqrt{7}}{3}\pi a^3$. C. $V = \frac{8}{3}\pi a^3$. D. $V = 8\pi a^3$.

Câu 38. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:



Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x + 1)$ là

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 3.

Câu 39. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx + 4}{x + m}$ nghịch biến khoảng $(0; +\infty)$.

- A. $0 \leq m \leq 2$. B. $0 \leq m < 2$. C. $-2 < m < 2$. D. $0 < m < 2$.

Câu 40. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + (m+6)x - m^2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

- A. 4. B. 5. C. 7 D. 6


Câu 41. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{2}{3}t^3 + 8t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{521}{3}$ (m/s) B. 27 (m/s) C. 32 (m/s) D. 24 (m/s)

Câu 42. Bất phương trình $\log_2^2 x - 2\log_{\sqrt{2}} x + 3 > 0$ có tập nghiệm là


- A. $S = (-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$. B. $(-\infty; 2) \cup (8; +\infty)$. C. $S = (0; 2) \cup (8; +\infty)$. D. $(0; 1) \cup (3; +\infty)$.

Câu 43. Cho lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B . Biết $AB = a$, $A'B = a\sqrt{2}$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$



- A. $\frac{a^3}{2}$. B. $\frac{a^3}{6}$. C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 44. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$; $AD = a$. SA vuông góc $(ABCD)$. Gọi M trung điểm CD , góc giữa SM và mặt phẳng $(ABCD)$ là 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$



- A. $\frac{2\sqrt{6}a^3}{9}$ B. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{9}$ C. $\frac{2a^3}{3}$ D. $\frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$

Câu 45. Cho một hình nón có chiều cao $h=3$ và bán kính đáy $r=4$. Mặt phẳng (P) đi qua S cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho $AB=6$. Tính khoảng cách d từ tâm của đường tròn đáy đến (P) .

A. $d = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $d = \frac{3\sqrt{7}}{4}$

C. $d = \frac{\sqrt{3}}{4}$

D. $d = \frac{3\sqrt{5}}{4}$

Câu 46. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - 6\log_3 x + 3m - 5 = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt thuộc $(1; 3^8)$

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Câu 47. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $9^x - 10 \cdot 3^{1+x} + 29 \leq 0$ là


A. 3

B. 2.

C. 5

D. 4.

Câu 48. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chọn khẳng định đúng về dấu của a, b, c, d ?



A. $a > 0, b < 0, c > 0, d < 0$

B. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$

C. $a > 0, b > 0, c < 0, d < 0$.

D. $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$

Câu 49. Số nghiệm thực của phương trình $\log_4(x+9) - 2\log_4(x-3) = 0$ là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 50. Trong không gian, cho tam giác vuông ABC tại B có $AB=1$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Quay tam giác đó xung quanh trục AB ta được một hình nón. Tính thể tích khối nón đó.

A. π

B. 2π

C. 3π

D. 4π

----- HẾT -----