

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

**PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):**

**Câu 1:** Cho dãy các chất: Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>Cl, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, ZnSO<sub>4</sub>, Al(OH)<sub>3</sub>, Zn(OH)<sub>2</sub>. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

- A. 4.                    B. 5.                    C. 2.                    D. 3.

**Câu 2:** Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> đựng riêng biệt trong ba lọ bị mờ nhăn, ta dùng thuốc thử là

- A. Al.                    B. Fe.                    C. CuO.                    D. Cu.

**Câu 3:** Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khói lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

- A. C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>.                    B. C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>.                    C. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>.                    D. C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>.

**Câu 4:** Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO<sub>3</sub> (hoặc Ag<sub>2</sub>O) trong dung dịch NH<sub>3</sub>, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO<sub>3</sub> loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở dktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

- A. CH<sub>3</sub>CHO.                    B. HCHO.                    C. CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CHO.                    D. CH<sub>2</sub>=CHCHO.

**Câu 5:** Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS<sub>2</sub> và a mol Cu<sub>2</sub>S vào axit HNO<sub>3</sub> (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

- A. 0,075.                    B. 0,12.                    C. 0,06.                    D. 0,04.

**Câu 6:** Anion X<sup>-</sup> và cation Y<sup>2+</sup> đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

B. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

C. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).

**Câu 7:** Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO<sub>2</sub>, 1,4 lít khí N<sub>2</sub> (các thể tích khí đo ở dktc) và 10,125 gam H<sub>2</sub>O. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, O = 16)

- A. C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>N.                    B. C<sub>3</sub>H<sub>9</sub>N.                    C. C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>N.                    D. C<sub>2</sub>H<sub>7</sub>N.

**Câu 8:** Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở dktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br<sub>2</sub> 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br<sub>2</sub> giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)

- A. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> và C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>.                    B. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> và C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>.                    C. C<sub>3</sub>H<sub>4</sub> và C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>.                    D. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> và C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>.

**Câu 9:** Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

- A. eten và but-2-en (hoặc buten-2).                    B. eten và but-1-en (hoặc buten-1).  
C. propen và but-2-en (hoặc buten-2).                    D. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).

**Câu 10:** Nilon-6,6 là một loại

- A. tơ poliamit.                    B. tơ visco.                    C. polieste.                    D. tơ axetat.

**Câu 11:** Cho các phản ứng sau:

- a)  $\text{FeO} + \text{HNO}_3$  (đặc, nóng)  $\rightarrow$   
c)  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3$  (đặc, nóng)  $\rightarrow$   
e)  $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}, t^o}$   
g)  $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \rightarrow$   
b)  $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4$  (đặc, nóng)  $\rightarrow$   
d)  $\text{Cu} + \text{dung dịch FeCl}_3 \rightarrow$   
f) glucozơ +  $\text{AgNO}_3$  (hoặc  $\text{Ag}_2\text{O}$ ) trong dung dịch  $\text{NH}_3 \rightarrow$   
h) glixerol (glicerin) +  $\text{Cu(OH)}_2 \rightarrow$

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:

- A. a, b, d, e, f, h.      B. a, b, d, e, f, g.      C. a, b, c, d, e, h.      D. a, b, c, d, e, g.

**Câu 12:**  $\alpha$ -aminoaxit X chứa một nhóm  $-\text{NH}_2$ . Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5)

- A.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ .      B.  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ .  
C.  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ .      D.  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$ .

**Câu 13:** Dãy gồm các ion  $X^+$ ,  $Y^-$  và nguyên tử Z đều có cấu hình electron  $1s^22s^22p^6$  là:

- A.  $\text{Li}^+$ , F<sup>-</sup>, Ne.      B.  $\text{K}^+$ , Cl<sup>-</sup>, Ar.      C.  $\text{Na}^+$ , Cl<sup>-</sup>, Ar.      D.  $\text{Na}^+$ , F<sup>-</sup>, Ne.

**Câu 14:** Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit  $\text{HNO}_3$ , thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và  $\text{NO}_2$ ) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với  $\text{H}_2$  bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)

- A. 4,48.      B. 5,60.      C. 3,36.      D. 2,24.

**Câu 15:** Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư  $\text{AgNO}_3$  (hoặc  $\text{Ag}_2\text{O}$ ) trong dung dịch  $\text{NH}_3$ , đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108)

- A.  $\text{HCHO}$ .      B.  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CHO}$ .      C.  $\text{CH}_3\text{CHO}$ .      D.  $\text{OHC-CHO}$ .

**Câu 16:** Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

- A. điện phân nóng chảy  $\text{NaCl}$ .  
B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với  $\text{MnO}_2$ , đun nóng.  
C. cho  $\text{F}_2$  đẩy  $\text{Cl}_2$  ra khỏi dung dịch  $\text{NaCl}$ .  
D. điện phân dung dịch  $\text{NaCl}$  có màng ngăn.

**Câu 17:** Phát biểu **không** đúng là:

- A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí  $\text{CO}_2$ , lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch  $\text{NaOH}$  lại thu được natri phenolat.  
B. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch  $\text{NaOH}$  lại thu được anilin.  
C. Phenol phản ứng với dung dịch  $\text{NaOH}$ , lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.  
D. Axit axetic phản ứng với dung dịch  $\text{NaOH}$ , lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí  $\text{CO}_2$  lại thu được axit axetic.

**Câu 18:** Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  đứng trước cặp  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ ):

- A.  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ .      B.  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ .  
C.  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ .      D.  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ .

**Câu 19:** Hỗn hợp X gồm axit  $\text{HCOOH}$  và axit  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  (có xúc tác  $\text{H}_2\text{SO}_4$  đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

- A. 8,10.      B. 16,20.      C. 6,48.      D. 10,12.

**Câu 20:** Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glicerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

- A.  $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$  và  $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ .      B.  $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$  và  $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ .  
C.  $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$  và  $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ .      D.  $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$  và  $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ .

**Câu 21:** Dung dịch HCl và dung dịch  $\text{CH}_3\text{COOH}$  có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử  $\text{CH}_3\text{COOH}$  thì có 1 phân tử điện li)

- A.  $y = x - 2$ .      B.  $y = 2x$ .      C.  $y = 100x$ .      D.  $y = x + 2$ .

**Câu 22:** Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)

- A. 10.      B. 20.      C. 30.      D. 40.

**Câu 23:** Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử  $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$  tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở dktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quy ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với  $\text{H}_2$  bằng 13,75. Cân cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23)

- A. 16,5 gam.      B. 15,7 gam.      C. 14,3 gam.      D. 8,9 gam.

**Câu 24:** Trộn dung dịch chứa a mol  $\text{AlCl}_3$  với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

- A.  $a : b = 1 : 5$ .      B.  $a : b = 1 : 4$ .      C.  $a : b > 1 : 4$ .      D.  $a : b < 1 : 4$ .

**Câu 25:** Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit  $\text{HCl}$  1M và axit  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0,5M, thu được 5,32 lít  $\text{H}_2$  (ở dktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là

- A. 7.      B. 1.      C. 2.      D. 6.

**Câu 26:** Cho luồng khí  $\text{H}_2$  (dư) qua hỗn hợp các oxit  $\text{CuO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{MgO}$  nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

- A. Cu, FeO, ZnO, MgO.      B. Cu, Fe, Zn, Mg.      C. Cu, Fe, Zn, MgO.      D. Cu, Fe,  $\text{ZnO}$ , MgO.

**Câu 27:** Cho từng chất: Fe,  $\text{FeO}$ ,  $\text{Fe(OH)}_2$ ,  $\text{Fe(OH)}_3$ ,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe(NO}_3)_2$ ,  $\text{Fe(NO}_3)_3$ ,  $\text{FeSO}_4$ ,  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ,  $\text{FeCO}_3$  lần lượt phản ứng với  $\text{HNO}_3$  đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là

- A. 5.      B. 7.      C. 6.      D. 8.

**Câu 28:** Cho từ từ dung dịch chứa a mol  $\text{HCl}$  vào dung dịch chứa b mol  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở dktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:

- A.  $V = 22,4(a - b)$ .      B.  $V = 22,4(a + b)$ .      C.  $V = 11,2(a - b)$ .      D.  $V = 11,2(a + b)$ .

**Câu 29:** Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch  $\text{KMnO}_4$  0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)

- A. 40.      B. 80.      C. 60.      D. 20.

**Câu 30:** Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

- A.  $\text{Cu(OH)}_2$  trong NaOH, đun nóng.      B.  $\text{AgNO}_3$  (hoặc  $\text{Ag}_2\text{O}$ ) trong dung dịch  $\text{NH}_3$ , đun nóng.      C.  $\text{Cu(OH)}_2$  ở nhiệt độ thường.      D. kim loại Na.

**Câu 31:** Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol  $\text{CO}_2$ . Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

- A.  $\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ .      B.  $\text{HOOC-COOH}$ .  
C.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{-COOH}$ .      D.  $\text{CH}_3\text{-COOH}$ .

**Câu 32:** Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí  $\text{CO}_2$  (ở dktc) vào 2,5 lít dung dịch  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137)

- A. 0,032.      B. 0,04.      C. 0,048.      D. 0,06.


**Câu 33:** Mệnh đề **không** đúng là:

- A.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH=CH}_2$  tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.      B.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH=CH}_2$  tác dụng được với dung dịch  $\text{Br}_2$ .  
C.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH=CH}_2$  cùng dãy đồng đẳng với  $\text{CH}_2=\text{CHCOOCH}_3$ .      D.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH=CH}_2$  có thể trùng hợp tạo polime.

**Câu 34:** Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử  $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$  tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

- A.  $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$ .      B.  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$ .      C.  $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ .      D.  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ .

**Câu 35:** Cho sơ đồ



Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:

- A.  $\text{C}_6\text{H}_6(\text{OH})_6$ ,  $\text{C}_6\text{H}_6\text{Cl}_6$ .  
B.  $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$ ,  $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$ .  
C.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ .  
D.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ .

**Câu 36:** Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

- A. 3,28 gam.      B. 8,56 gam.      C. 8,2 gam.      D. 10,4 gam.  
**Câu 37:** Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch  $\text{AlCl}_3$ . Hiện tượng xảy ra là  
A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.      B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  
C. chỉ có kết tủa keo trắng.      D. không có kết tủa, có khí bay lên.

**Câu 38:** Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch  $\text{HNO}_3$  đặc, nóng là

- A. 10.      B. 8.      C. 9.      D. 11.

**Câu 39:** Khi nung hỗn hợp các chất  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  và  $\text{FeCO}_3$  trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là

- A. Fe.      B.  $\text{FeO}$ .      C.  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .      D.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

**Câu 40:** Điện phân dung dịch  $\text{CuCl}_2$  với điện cực tro, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64)

- A. 0,2M.      B. 0,1M.      C. 0,05M.      D. 0,15M.

**Câu 41:** Cho m gam tinh bột lén men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng  $\text{CO}_2$  sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)

- A. 650.      B. 550.      C. 810.      D. 750.

**Câu 42:** Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

- A.  $\text{CH}_3\text{OH}$  và  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ .      B.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  và  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ .  
C.  $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$  và  $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ .      D.  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$  và  $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ .

**Câu 43:** Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

- A. 5.      B. 6.      C. 4.      D. 3.

**Câu 44:** Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là

- A. NO.      B.  $\text{NO}_2$ .      C.  $\text{N}_2\text{O}$ .      D.  $\text{N}_2$ .

**PHẦN RIÊNG:** Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II)

**Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):**

**Câu 45:** Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:

- A. Fe, Ca, Al.      B. Na, Ca, Al.      C. Na, Cu, Al.      D. Na, Ca, Zn.

**Câu 46:** Mệnh đề **không** đúng là:

- A. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự:  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{H}^+$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Ag}^+$ .  
B. Fe khử được  $\text{Cu}^{2+}$  trong dung dịch.  
C.  $\text{Fe}^{2+}$  oxi hóa được Cu.  
D.  $\text{Fe}^{3+}$  có tính oxi hóa mạnh hơn  $\text{Cu}^{2+}$ .

**Câu 47:** Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch  $H_2SO_4$  đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đôi với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

- A.  $C_4H_8$ .      B.  $C_3H_4$ .      C.  $C_3H_6$ .      D.  $C_3H_8$ .

**Câu 48:** Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí  $CO_2$ , 0,56 lít khí  $N_2$  (các khí đo ở dktc) và 3,15 gam  $H_2O$ . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối  $H_2N-CH_2-COONa$ . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

- A.  $H_2N-CH_2-COO-C_3H_7$ .      B.  $H_2N-CH_2-COO-CH_3$ .  
C.  $H_2N-CH_2-COO-C_2H_5$ .      D.  $H_2N-CH_2-CH_2-COOH$ .

**Câu 49:** Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm  $Fe_2O_3$ ,  $MgO$ ,  $ZnO$  trong 500 ml axit  $H_2SO_4$  0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65)

- A. 3,81 gam.      B. 4,81 gam.      C. 5,81 gam.      D. 6,81 gam.

**Câu 50:** Dãy gồm các chất đều tác dụng với  $AgNO_3$  (hoặc  $Ag_2O$ ) trong dung dịch  $NH_3$ , là:

- A. axit fomic, vinylaxetilen, propin.      B. andehit fomic, axetilen, etilen.  
C. andehit axetic, butin-1, etilen.      D. andehit axetic, axetilen, butin-2.

## Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):

**Câu 51:** Có 4 dung dịch muối riêng biệt:  $CuCl_2$ ,  $ZnCl_2$ ,  $FeCl_3$ ,  $AlCl_3$ . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch  $NH_3$  (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

- A. 2.      B. 1.      C. 3.      D. 4.

**Câu 52:** Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol  $CH_3COOH$  và 1 mol  $C_2H_5OH$ , lượng este lớn nhất thu được là  $2/3$  mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol  $CH_3COOH$  cần số mol  $C_2H_5OH$  là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

- A. 2,925.      B. 0,456.      C. 2,412.      D. 0,342.

**Câu 53:** Phát biểu **không** đúng là:

- A. Các hợp chất  $CrO$ ,  $Cr(OH)_2$  tác dụng được với dung dịch HCl còn  $CrO_3$  tác dụng được với dung dịch NaOH.  
B. Thêm dung dịch kiềm vào muối dicromat, muối này chuyển thành muối cromat.  
C. Các hợp chất  $Cr_2O_3$ ,  $Cr(OH)_3$ ,  $CrO$ ,  $Cr(OH)_2$  đều có tính chất lưỡng tính.  
D. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.

**Câu 54:** Cho các chất: HCN,  $H_2$ , dung dịch  $KMnO_4$ , dung dịch  $Br_2$ . Số chất phản ứng được với  $(CH_3)_2CO$  là

- A. 4.      B. 1.      C. 3.      D. 2.

**Câu 55:** Một este có công thức phân tử là  $C_4H_6O_2$ , khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetandehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là

- A.  $HCOO-C(CH_3)=CH_2$ .      B.  $HCOO-CH=CH-CH_3$ .  
C.  $CH_3COO-CH=CH_2$ .      D.  $CH_2=CH-COO-CH_3$ .

**Câu 56:** Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol  $Al_2O_3$ , b mol  $CuO$ , c mol  $Ag_2O$ ), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa  $(6a + 2b + 2c)$  mol  $HNO_3$  được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)

- A.  $2c$  mol bột Cu vào Y.      B.  $c$  mol bột Al vào Y.  
C.  $c$  mol bột Cu vào Y.      D.  $2c$  mol bột Al vào Y.

----- HẾT -----